

# メンタルヘルス科

## ●スタッフ (平成29年10月1日現在)

診療科長 井上 猛  
医局長 松本 恭典  
病棟医長 作田 慶輔  
外来医長 小野 泰之

医師数 常勤 19名  
非常勤 15名

## ●診療科の特徴

当診療科は、新宿新都心の高層ビル街に位置する大学病院という特性があります。約150人／日の外来患者および約11人／月の新入院患者の診療にあたり、また、総合病院の精神科として精神疾患を合併した患者に対してコンサルテーション・リエゾン活動を行っております。その為、症例はうつ病・双極性障害といった気分障害や統合失調症をはじめ、パニック障害などの不安障害や摂食障害、パーソナリティ障害、器質・症状性精神障害など多岐にわたり、軽症から重症まで様々な症例の診療・治療を行っております。光トポグラフィーも導入し、脳波、心理検査などを併用することでさらに診断の精度向上を図っております。近年、地域の医療機関との連携強化を図り、重症例は当科にて入院も含め加療し、寛解後地域社会に戻って生活していただくなどのサポート・相互連携を行っております。

## ●診療体制と実績


主任教授：1名、准教授：2名、院内講師：2名、  
助教：5名、後期研修医：7名、  
兼任医師：14名、臨床心理士：2名  
専門医および指導医・認定医数  
日本精神神経学会 専門医 7名  
指導医 7名  
精神保健指定医 8名  
日本医師会 認定産業医 2名

## 診療実績

### ・入院診療の実績 【2017年度】

のべ入院患者数 138名


#### 入院患者の疾患別割合 (%)



### ・外来診療の実績 【2017年度】

初診患者数 837名(院内からの紹介患者を除く)  
のべ外来患者数 33,128名

## 再診患者の疾患別割合 (%)



## ・臨床研究等の実績 【2017年度】

Ikeda M et al., the advanced Collaborative Study of Mood Disorder (COSMO) team : A genome-wide association study identifies two novel susceptibility loci and trans population polygenicity associated with bipolar disorder. Mol Psychiatry 2017. doi : 10.1038/mp.2016.259. [Epub ahead of print]  
Shimura A et al. : Childhood parental bonding affects adulthood trait anxiety through self-esteem. Compr Psychiatry 74 : 15-20, 2017.

Ono K et al. : Associations among depressive symptoms, childhood abuse, neuroticism, and adult stressful life events in the general adult population. Neuropsych. Dis. Treat. 13 : 477-482, 2017.

Ono Y et al. : The influence of parental care and overprotection, neuroticism and adult stressful life events on depressive symptoms in the general adult population. J Affect Disord 217 : 66-72, 2017.

Minami S et al. : Suppression of reward-induced dopamine release in the nucleus accumbens of animal models for depression: difference in responsiveness to drug treatment. Neuroscience Letters 650 : 72-76, 2017.

Matsui K et al. : Effect of aripiprazole on non-24-hour sleep-wake rhythm disorder comorbid with major depressive disorder: a case report. Neuropsych. Dis. Treat. 13 : 1367-1371, 2017.

Takaesu Y et al. : Circadian rhythm sleep-wake disorders as predictors for bipolar disorder in patients with remitted mood disorders. J Affect Disord 220 : 57-61, 2017.

Mitsui N, Nakai Y, Inoue T, Udo N, Kitagawa K, Wakatsuki Y, Kameyama R, Toyomaki A, Ito YM, Kitaichi Y, Nakagawa S, Kusumi I: Association between suicide-related ideations and affective temperaments in the Japanese general adult population. PLoS One 12 (6) : e0179952, 2017.

Okubo R et al. : The mediator effect of personality traits on the relationship between childhood abuse and depressive symptoms in schizophrenia. Psychiatry Res 257 : 126-131, 2017.

Matsuzaki H et al. : Re-analysis of the association of temperature or sunshine with hyperthymic temperament using lithium levels of drinking water. J Affect Disord 223 : 126-129, 2017.

Otsuka A et al. : Interpersonal sensitivity mediates the effects of child abuse and affective temperaments on depressive symptoms in the general adult population. Neuropsych. Dis. Treat. 13 : 2559-2568, 2017.

Ishii N et al. : Lithium in drinking water may be associated with depressive and irritable temperaments in nonclinical population. Clin Neuropsychopharmacol Ther 8 : 7-11, 2017.  
井上 猛、小野泰之：双極性うつ病の薬物療法の現状. 精神科治療学 32 (9) : 1139-1146, 2017.

井上 猛：一般成人におけるストレスとパーソナリティの相互作用. ストレス科学 32 (1) : 8-17, 2017.

井上 猛、稻垣 芳文、木村 敏史、田辺 肇、白川 治、JET study investigator group : 大うつ病エピソードを呈する気分障害患者における自殺関連事象の発現頻度とその関連因子の検討. 臨床精神医学 46 (2) : 215-226, 2017.