

・**全世界:新型コロナウイルスの流行状況**

新型コロナウイルスの累積感染者数は8月下旬までに約2300万人、死亡者数は約81万人にのぼっています(米国ジョンホプキンス大学 2020-8-24)。1か月前に比べて累積感染者数は約700万人増えています。新規発生数は横ばい傾向です(WHO Corona virus disease 2020-8-17)。地域別ではアメリカ大陸での発生が多く、とくに南米での感染者数が増加しています。米国やブラジルでは毎日4万人前後の感染者が発生していますが、先月よりも少なくなってきました。アジアではインドやフィリピンでの感染者数も多く、とくにインドでは日に6万人を越えることもあります。西ヨーロッパでは流行の再燃がみられており、スペインやフランスなどで増加傾向にあります。アフリカでは南アフリカで感染者数が多くみられましたが、最近では減少しています。

日本政府は、感染状況が落ち着いている国との間で、ビジネス渡航の再開を図っています。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html

この事業は出国前に自国で新型コロナウイルスのPCR検査を受け、陰性証明書を持参した者を渡航させる方法です。ベトナム、タイとの間では交渉が成立しており、東アジアや東南アジア諸国との外交交渉を進めています

・**南半球:季節性インフルエンザ流行は未発生**

南半球は6月頃から冬季に入り、毎年、季節性インフルエンザの流行がみられます。しかし、今年はオーストラリア、ニュージーランド、南米、アフリカ南部のいずれの地域でも、インフルエンザの流行がまだ発生していません(WHO influenza 2020-8-17)。この理由として、南半球では新型コロナが流行しているため、ウイルス同士の干渉現象がおきているという説や、新型コロナの予防対策がインフルエンザの予防に役立っているという説が考えられています。今後、北半球でも、冬になった時にインフルエンザの流行が抑えられるかどうかは不明です。

・**アジア:東南アジアでのデング熱流行**

シンガポールでは今年のデング熱患者数が2万人を越えており、例年になく大きな流行となっており、WHO 西太平洋 2020-8-13)。一方、それ以外の東南アジアの国々では患者数が例年よりも少ない状況です。マレーシアでは6万人、フィリピンでは5万人、ベトナムやタイでは4万人の患者が報告されています。

・アジア: ミャンマーでジフテリア患者が増加

ミャンマー東部のシャン州で7月末からジフテリア患者が多発しています。患者数は36人にのぼり、うち5人が死亡しました(Outbreak News Today 2020-8-14)。ジフテリア菌は患者の飛沫などから感染し、主に呼吸器系の症状をおこします。予防にはワクチン接種が最も有効で、破傷風と百日咳との三種混合ワクチンを接種します。

・アフリカ: コンゴのエボラ熱流行

コンゴ民主共和国北西部にある赤道州で6月からエボラ熱の流行が発生しています。8月中旬までに州都 Mbandaka などでは患者数は100人以上にのぼり、うち43人が死亡しました(WHO アフリカ 2020-8-21)。最近1か月で患者数は2倍近くに増えています。

・南米: デング熱の流行が拡大

南米でデング熱の流行が拡大しています。パラグアイでは今年の患者数が22万人を越え、統計をとるようになってから最も多い数になりました(Outbreak News Today 2020-8-14)。ペルーでも患者数は3万人近くで、これは昨年より3倍以上の数です(Outbreak News Today 2020-8-12)。南米では新型コロナウイルスの流行により、蚊を減らす対策が停滞していることがデング熱流行の原因と考えられています。