

対象疾患	レジメン名称	投与サイクル	投与間隔
卵巣がん	TC+BEV	PDまで	3週間

【投与スケジュール】

PTX 175mg/m² d1 + CBDCA (AUC 6) d1 + BEV 15mg/kg d1 q3w

					サイクル数	1-6	7-
	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1	d1	
末梢メイン) A	生理食塩液 (500mL)	1 V	6時間30分 (BEV初回)	6時間 (BEV2回目) 5時間30分 (BEV3回目以降)	○		
末梢メイン) B	生理食塩液 (100mL)	1 V	1時間			○	
末梢側管) ①	生理食塩液 (50mL)	1 P	10分		○		
	デカドロン (6.6mg)	2.5 V					
	ガスター	1 A					
末梢側管) ②	生理食塩液 (50mL)	1 P	10分			○	
	デカドロン (6.6mg)	1 V					
末梢側管) ③	アロキシバッグ	1 P	30分		○		
末梢側管) ④	パクリタキセル	175 mg/m²	3時間		○		
	生理食塩液 (500mL)	1 V					
末梢側管) ⑤	カルボプラチン	AUC 6	1時間		○		
	生理食塩液 (250mL)	1 V					
末梢側管) ⑥	アバステン	15 mg/kg	1時間30分 (BEV初回)	1時間 (BEV2回目) 30分 (BEV3回目以降)	○	○	
	生理食塩液 (100mL)	0.6 V					

点滴順序 : 1-6サイクル目 メイン)A → 側管)① → 側管)③ → 側管)④ → 側管)⑤ → 側管)⑥

7-サイクル目 メイン)B → 側管)② → 側管)⑥

【備考】