

対象疾患	レジメン名称	投与サイクル	投与間隔
卵巣がん	術後 TC+BEV	22回	3週間

【投与スケジュール】

PTX 175mg/m² d1 + CBDCA (AUC 6) d1 + BEV 15mg/kg d1 q3w

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	サイクル数		
					1 d1	2-6 d1	7-22 d1
末梢メイン A	生理食塩液 (500mL)	1 V	5時間		○		
末梢メイン A'	生理食塩液 (500mL)	1 V	6時間30分 (BEV初回)	6時間 (BEV2回目) 5時間30分 (BEV3回目以降)		○	
末梢メイン B	生理食塩液 (100mL)	1 V	1時間				○
末梢側管)①	生理食塩液 (50mL)	1 P	10分		○	○	
	デカドロン (6.6mg)	2.5 V					
	ガスター	1 A					
末梢側管)②	生理食塩液 (50mL)	1 P	10分				○
	デカドロン (6.6mg)	1 V					
末梢側管)③	アロキシバッグ	1 P	30分		○	○	
末梢側管)④	パクリタキセル	175 mg/m²	3時間		○	○	
	生理食塩液 (500mL)	1 V					
末梢側管)⑤	カルボプラチン	AUC 6	1時間		○	○	
	生理食塩液 (250mL)	1 V					
末梢側管)⑥	アバステン	15 mg/kg	1時間30分 (BEV初回)	1時間 (BEV2回目) 30分 (BEV3回目以降)		○	○
	生理食塩液 (100mL)	0.6 V					

点滴順序 : 1サイクル目 メイン)A → 側管)① → 側管)③ → 側管)④ → 側管)⑤

2-6サイクル目 メイン)A' → 側管)① → 側管)③ → 側管)④ → 側管)⑤ → 側管)⑥

7-22サイクル目 メイン)B → 側管)② → 側管)⑥

【備考】

内服 : 1サイクル目-6サイクル目 レスタミン 1回5錠 化学療法前