

対象疾患	レジメン名称	投与サイクル	投与間隔
子宮頸がん	CDGP(80)+CPT	6回orPD	3週間

【投与スケジュール】

CDGP 80mg/m² d1 + CPT 60mg/m² d1,8 q3w

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1	d2	d3	d4	d8
末梢メイン)A	ソリアセトF (500mL)	1 V	各1時間30分		○				
	ソリタT3(500mL)	1 V							
	ソリアセトF (500mL)	1 V							
	ソリタT3(500mL)	1 V							
	ソリアセトF (500mL)	1 V							
末梢メイン)B	ソリアセトF (500mL)	1 V	各2時間			○	○	○	
	ソリタT3(500mL)	1 V							
末梢メイン)C	ソリタT3(500mL)	1 V	1時間40分						○
末梢側管)①	アロキシバグ	1 P	10分		○				
	デカドロン (6.6mg)	1.5 V							
末梢側管)②	生理食塩液 (50mL)	1 P	10分			○	○	○	
	デカドロン (6.6mg)	1 V							
末梢側管)③	アロキシバグ	1 P	10分						○
	デカドロン (6.6mg)	1.5 V							
末梢側管)④	イリノテカン	60 mg/m²	1時間30分		○				○
	生理食塩液 (500mL)	1 V							
末梢側管)⑤	アクブラ	80 mg/m²	2時間		○				
	生理食塩液 (250mL)	1 V							
末梢側管)⑥	生理食塩液(100mL)	1 P	15分		○				
	ランソックス(20mg)	1 V							

点滴順序: day1 メイン)A → 側管)① → 側管)④ → 側管)⑤ → 側管)⑥

点滴順序: day2-4 メイン)B → 側管)②

点滴順序: day8 メイン)C → 側管)③ → 側管)④

【備考】

内服: アブレピタント(125mg) 1回1錠 1日1回 治療前 day1, アブレピタント(80mg) 1回1錠 1日1回 午前中 day2,3

ウルソ(100mg) 1回1錠 1日3回 毎食後 day1-4,8-11

マグミット(330mg) 1回1錠 1日3回 毎食後 day1-4,8-11

メトクロプラミド(5mg) 1回1錠 1日3回 毎食後 day1-4,8-11