

対象疾患	レジメン名称	投与サイクル	投与間隔
卵巣がん	CTP-P	6回orPD	4週間

【投与スケジュール】

ODDP 60mg/m² d1 + CPT 60mg/m² d1,8 q3w

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1	d2	d3	d4	d8	d15
末梢メイン)A	ソリタT3 (500mL)	1 V	各1時間30分		○					
	硫酸マグネシウム(20mEq/20mL)	0.8 V								
	生理食塩液(500mL)	1 V								
	ソリタT3(500mL)	1 V								
	生理食塩液(500mL)	1 V								
	ソリタT3(500mL)	1 V								
末梢メイン)B	ラクテック (500mL)	1 V	各2時間			○	○	○		
	ソリタT3(500mL)	1 V								
末梢メイン)C	ソリタT3(500mL)	1 V	各2時間						○	○
末梢側管)①	アロキシパッグ	1 P	10分		○					
	デカドロン (6.6mg)	1.5 V								
末梢側管)②	生理食塩液 (50mL)	1 P	10分			○	○	○		
	デカドロン (6.6mg)	1 V								
末梢側管)③	アロキシパッグ	1 P	10分						○	○
	デカドロン (6.6mg)	1 V								
末梢側管)④	イリノテカン	60 mg/m²	1時間30分		○				○	○
	生理食塩液 (500mL)	1 V								
末梢側管)⑤	シスプラチン	60 mg/m²	2時間		○					
	生理食塩液 (500mL)	1 V								
末梢側管)⑥	マンニトール	300 mL	30分		○					
末梢側管)⑦	生理食塩液(100mL)	1 P	15分		○					
	ランックス(20mg)	1 V								

点滴順序: day1 メイン)A → 側管)① → 側管)④ → 側管)⑤ → 側管)⑥ → 側管)⑦

点滴順序: day2-4 メイン)B → 側管)②

点滴順序: day8,15 メイン)C → 側管)③ → 側管)④

【備考】

内服: アブレビタント(125mg) 1回1錠 1日1回 治療前 day1, アブレビタント(80mg) 1回1錠 1日1回 午前中 day2,3

ウルソ(100mg) 1回1錠 1日3回 毎食後 day1-4,8-11,15-18

マグミット(330mg) 1回1錠 1日3回 毎食後 day1-4,8-11,15-18

メトクロプラミド(5mg) 1回1錠 1日3回 毎食後 day1-4,8-11,15-18