

対象疾患	レジメン名称	投与サイクル	投与間隔
卵巣がん	PLD+CBDCA+BV	PDまで	【1-6サイクル目】4週間 【7サイクル目以降】3週間

【投与スケジュール】

【1-6サイクル目】PLD 30mg/m² d1 +CBDCA AUC5 d1+BV 10mg/kg d1.15 q4w

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1	d15
末梢メイン)A	5%ブドウ糖(250mL)	1 V	3時間50分	2回目以降:2時間50分	○	
末梢メイン)B	生理食塩液(100mL)	1 V	1時間			○
末梢側管)①	アロキシバッグ(0.75mg) デカドロン(6.6mg)	1 P 1.5 V	10分		○	
末梢側管)②	ドキシル 5%ブドウ糖(250mL)	30 mg/m² 1 V	1時間		○	
末梢側管)③	カルボプラチン 生理食塩液(250mL)	5 AUC 1 V	1時間		○	
末梢側管)④	アバステン 生理食塩液(250mL)	10 mg/kg 1 V	1時間30分	2回目:1時間 3回目以降:30分	○	○
末梢側管)⑤	生理食塩液(50mL)	1 V	全開		○	

点滴順序:d1:メイン)A → 側管)① → 側管)② → 側管)③ → 側管)④ → 側管)⑤

d15:メイン)B → 側管)④

【7サイクル目以降】BV 15mg/kg d1 q3w

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1
末梢メイン)A	生理食塩液(100mL)	1 V	30分		○
末梢側管)①	アバステン 生理食塩液(250mL)	15 mg/kg 1 V	30分		○

点滴順序:メイン)A → 側管)①

【備考】

投与サイクル数はPLD累積投与量が500mg/m²を超えないようにする。