

対象疾患	レジメン名称	投与サイクル	投与間隔
子宮頸がん	Pembrolizumab+PTX+CBDCA	PDまで※	3週間

【投与スケジュール】

**Pembrolizumab 200mg/body d1 + PTX 175mg/m<sup>2</sup> d1 + CBDCA (AUC 5) d1 q3w**

	薬剤名	数量	点滴時間	サイクル数	1-6	7-35※
				備考	d1	d1
末梢メイン A	生理食塩液 (500mL)	1 V	5時間30分		○	
末梢メイン B	生理食塩液 (100mL)	1 V	1時間			○
末梢側管)①	<b>キイトルーダ</b>	<b>200 mg/body</b>	30分	6週毎投与: 400mg/body	○	○
	生理食塩液(100ml)	1 V				
末梢側管)②	生理食塩液 (50mL)	1 P	10分		○	
	デカドロン (6.6mg)	2.5 V				
	ガスター(20mg)	1 A				
末梢側管)③	アロキシパッグ	1 P	30分		○	
	アロカリス(235mg)	1 V				
末梢側管)④	<b>パクリタキセル</b>	<b>175 mg/m<sup>2</sup></b>	3時間		○	
	生理食塩液 (500mL)	1 V				
末梢側管)⑤	<b>カルボプラチン</b>	<b>AUC 5</b>	1時間		○	
	生理食塩液 (250mL)	1 V				

点滴順序 : 1-6サイクル目 メイン)A → 側管)① → 側管)② → 側管)③ → 側管)④ → 側管)⑤

7-35サイクル目 メイン)B → 側管)①(キイトルーダ6週間毎投与の場合、7-21サイクル目まで。)

【備考】

※1-6サイクル:Pembrolizumab+PTX+CBDCA、(7-35サイクル:【3週毎】Pembrolizumab維持療法 or 7-21サイクル:【6週毎】Pembrolizumab維持療法)

1-6サイクル目 内服 : レスタシン(10mg) 1回5錠 化学療法開始時