

対象疾患	レジメン名称	投与サイクル	投与間隔
尿路上皮がん	CBDCA+GEM	PDまで	3週間

【投与スケジュール】

**CBDCA (AUC 4.5) d1 + GEM 1000mg/m<sup>2</sup> d1.8 q3w**

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1	d8
末梢メイン)A	生理食塩液 (100ml)	1 V	1時間40分		○	
末梢メイン)B	生理食塩水(100mL)	1 V	40分			○
末梢側管)①	アロキシバッグ	1 P	10分		○	
	デカドロン(6.6mg)	1 V				
末梢側管)②	デカドロン(6.6mg)	1 V	10分			○
	生理食塩水(50mL)	1 V				
末梢側管)③	<b>ゲムシタピン</b>	<b>1000 mg/m<sup>2</sup></b>	30分		○	○
	生理食塩液 (100ml)	1 V				
末梢側管)④	<b>カルボプラチン</b>	<b>AUC 4.5</b>	1時間		○	
	生理食塩液 (250ml)	1 V				

点滴順序:d1 メイン)A → 側管)① → 側管)③ → 側管)④

d8 メイン)B → 側管)② → 側管)③

【備考】

内服:アプレピタント(125mg) 1回1錠 1日1回 治療前 day1, アプレピタント(80mg) 1回1錠 1日1回 午前中 day2,3