

対象疾患	レジメン名称	投与サイクル	投与間隔
悪性リンパ腫	ABVD	最大 8サイクル	4週間

【投与スケジュール】

DXR 25mg/m<sup>2</sup>+BLM 10mg/m<sup>2</sup>+VBL 6mg/m<sup>2</sup>+DTIC 375mg/m<sup>2</sup> d1,15 q4w

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1	d15
末梢メイン)A	ソリタT3 (500ml)	1 V	5時間		○	○
末梢側管)①	アロキシバッグ	1 P	30分		○	○
末梢側管)②	<b>ダカルバジン</b>	<b>375 mg/m<sup>2</sup></b>	1時間		○	○
	生理食塩液 (100ml)	1 V				
末梢側管)③	<b>ドキシソルピシン</b>	<b>25 mg/m<sup>2</sup></b>	15分		○	○
	5%ブドウ糖 (50ml)	1 V				
末梢側管)④	<b>エクザール</b>	<b>6 mg/m<sup>2</sup></b>	15分	最大量10mg	○	○
	生理食塩液 (50ml)					
末梢側管)⑤	ソル・コーテフ(100mg/V)	1 V	15分		○	○
	生理食塩液 (50ml)	1 V				
末梢側管)⑥	<b>ブレオ</b>	<b>15 mg/m<sup>2</sup></b>	15分	最大量15mg	○	○
	生理食塩液 (50ml)					

点滴順序:メイン)A → 側管)① → 側管)② → 側管)③ → 側管)④ → 側管)⑤ → 側管)⑥

【備考】