対象疾患	レジメン名称	投与サイクル	投与間隔	
悪性リンパ腫	R-Bendamustine	8サイクル	4週間	

【投与スケジュール】

Rituximab (375mg/m²): d1+Bendamustine (90mg/m²):d2. 3 q4w

	薬剤名	数量		点滴時間	備考	d1	d2-3
末梢メイン)A	ソリタ―T3 (500ml)	1	٧	6時間		0	
末梢メイン)B	ソルデム3A(200mL)	1	٧	3時間			0
末梢側管)①	グラニセトロン	1	Р	30分			0
	デカドロン(6.6mg)	1	٧	307)			
末梢側管)②	リツキサン	375 mg/m²		投与時間は備考		0	
	5%ブドウ糖(500ml)	1	٧	参照			
末梢側管)③	トレアキシン	90 mg/㎡		1時間			0
	生理食塩液 (250ml)	0.8	٧	1 四寸 [日]			J

点滴順序:メイン)A → 側管)① → 側管)② → 側管)③

【備考】

内服:ロキソプロフェン 1回1錠 1日3回 毎食後 d1、d-クロルフェニラミン徐放錠1回1錠 1日2回 朝夕食後 d1

リツキシマブの投与速度:18mL/hrで開始,30分後36mL/hr,1hr後54mL/hr,1.5hr後72mL/hr,2hr後90mL/hr,2.5hr後108mL/hr,3hr後126mL/hr,3.5hr後144mL/hr 2回目以降リツキシマブの投与速度は50mL/hr,30分後200mL/hrで1時間30分投与可

トレアキシンの投与速度は1時間に加えて10分投与可