対象疾患	レジメン名称	投与サイクル	投与間隔
悪性リンパ腫	R-CHOP	8サイクル	3週間

【投与スケジュール】

Rituximab (375mg/㎡):d1,CPA (750mg/㎡):d2, DXR (50mg/㎡):d2, VCR (1.4mg/㎡):d2, PSL (60mg/㎡):d2-6

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1	d2
ﾒｲﾝ)A	ソリターT3 (500ml)	1 V	8時間		○	
ﾒｲﾝ)B	ソリターT3 (500ml)	1 V	5時間			○
側管)①	**リツキサン**	**375 mg/㎡**	投与時間は備考参照		○	
	5%ブドウ糖(500ml)	1 V				
側管)②	アロキシバッグ	1 P	30分			○
側管)③	**オンコビン**	**1.4 mg/㎡**	15分			○
	生理食塩液(50ml)	1 V				
側管)④	**ドキソルビシン**	**50 mg/㎡**	15分			○
	5%ブドウ糖 (50ml)	1 V				
側管)⑤	**エンドキサン**	**750 mg/㎡**	2時間			○
	生理食塩液(500ml)	1 V				

点滴順序:d1,メイン)A → 側管)① d2,メイン)B → 側管)② → 側管)③ → 側管)④ → 側管)⑤

【備考】

内服:ロキソプロフェン 1回1錠 1日3回 毎食後 day1、d-クロルフェニラミン徐放錠1回1錠 1日2回 朝夕食後 day1

内服:プレドニゾロン(60mg/㎡)day2-6 原則1日1回朝食後内服(但し分割も可)

リツキシマブの投与速度:18mL/hrで開始,30分後36mL/hr,1hr後54mL/hr,1.5hr後72mL/hr,2hr後90mL/hr,2.5hr後108mL/hr,3hr後126mL/hr,3.5hr後144mL/hr

2回目以降リツキシマブの投与速度は50mL/hr,30分後200mL/hrで1時間30分投与可