

対象疾患	レジメン名称	投与サイクル	投与間隔
多発性骨髄種	s.c.DKd	PDまで	1-8サイクル:3週間 9サイクル以降:4週間

【投与スケジュール】

【1サイクル目】s.c.Dara 1800mg/body d1,8,15,22+Car 20mg/mf d1,2+Car 58mg/mf d8,9,15,16+DEX 20mg/body d1,2,8,9,15,16+DEX 40mg/body d22 q4w

※75歳以上の場合は、DEXはd1,2,8,15,22は20mg/body投与、d9,16は8mg/body投与

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1	d2	d8	d9	d15	d16	d22
メインA	5%ブドウ糖液(50mL)	1 V			○	○	○	○	○	○	
内服)①	レナデックス	20 mg/body		ダラキユーロ投与日: 投与1-3時間前に内服	○	○	○	○	○	○	○
側管)①	カイプロリス	20 mg/mf 58 mg/mf	30分	d1,2 d8,9,15,16	○	○	○	○	○	○	
	5%ブドウ糖液(250mL)	0.4 V		※5%ブドウ糖はd1,2では50mL							
皮下注	ダラキユーロ	1800 mg/body	5分		○		○		○		○
内服)②	ロキソプロフェン			3錠 分3 毎食後	○		○		○		○
内服)③	d-クロルフェニラミン徐放錠			2錠 分2 朝・夕食後	○		○		○		○
内服)④	モンテルカスト			1錠 分1 朝食後	○						

点滴順序:メインA → 側管)①

【2サイクル目】s.c.Dara 1800mg/body d1,8,15,22+Car 58mg/mf d1,2,8,9,15,16+DEX 20mg/body d1,2,8,9,15,16+DEX 40mg/body d22 q4w

※75歳以上の場合は、DEXはd1,8,15,22は20mg/body投与

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1	d2	d8	d9	d15	d16	d22
メインA	5%ブドウ糖液(50mL)	1 V			○	○	○	○	○	○	
内服)①	レナデックス	20 mg/body 40 mg/body	d1,2,8,9,15,16 d22	ダラキユーロ投与日: 投与1-3時間前に内服	○	○	○	○	○	○	○
側管)①	カイプロリス	58 mg/mf	30分		○	○	○	○	○	○	
	5%ブドウ糖液(250mL)	0.4 V									
皮下注	ダラキユーロ	1800 mg/body	5分		○		○		○		○
内服)②	ロキソプロフェン			3錠 分3 毎食後	○		○		○		○
内服)③	d-クロルフェニラミン徐放錠			2錠 分2 朝・夕食後	○		○		○		○

点滴順序:メインA → 側管)①

【3-8サイクル目】s.c.Dara 1800mg/body d1,15+Car 58mg/mf d1,2,8,9,15,16+DEX 20mg/body d1,2,8,9,15,16+DEX 40mg/body d22 q4w

※75歳以上の場合は、DEX20mg/bodyはd1,8,15,22に投与(d8,15の投与分をd8に12mg,d9に8mg、d15に12mg,d16に8mgに分割投与も可)

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1	d2	d8	d9	d15	d16	d22
メインA	5%ブドウ糖液(50mL)	1 V			○	○	○	○	○	○	
内服)①	レナデックス	20 mg/body 40 mg/body	d1,2,8,9,15,16 d22	ダラキユーロ投与日: 投与1-3時間前に内服	○	○	○	○	○	○	○
側管)①	カイプロリス	58 mg/mf	30分		○	○	○	○	○	○	
	5%ブドウ糖液(250mL)	0.4 V									
皮下注	ダラキユーロ	1800 mg/body	5分		○				○		
内服)②	ロキソプロフェン			3錠 分3 毎食後	○				○		
内服)③	d-クロルフェニラミン徐放錠			2錠 分2 朝・夕食後	○				○		

点滴順序:メインA → 側管)①

【9サイクル目以降】s.c.Dara 1800mg/body d1+Car 58mg/mf d1,2,8,9,15,16+DEX 20mg/body d1,2,8,9,15,16+DEX 40mg/body d22 q4w

※75歳以上の場合は、DEX20mg/bodyはd1,8,15,22に投与(d8,15の投与分をd8に12mg,d9に8mg、d15に12mg,d16に8mgに分割投与も可)

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1	d2	d8	d9	d15	d16	d22
メインA	5%ブドウ糖液(50mL)	1 V			○	○	○	○	○	○	
内服)①	レナデックス	20 mg/body 40 mg/body	d1,2,8,9,15,16 d22	ダラキユーロ投与日: 投与1-3時間前に内服	○	○	○	○	○	○	○
側管)①	カイプロリス	58 mg/mf	30分		○	○	○	○	○	○	
	5%ブドウ糖液(250mL)	0.4 V									
皮下注	ダラキユーロ	1800 mg/body	5分		○						
内服)②	ロキソプロフェン			3錠 分3 毎食後	○						
内服)③	d-クロルフェニラミン徐放錠			2錠 分2 朝・夕食後	○						

点滴順序:メインA → 側管)①

【備考】

ダラキユーロ投与日のみ 内服:ロキソプロフェン(60mg) 1回1錠 1日3回 毎食後、d-クロルフェニラミン徐放錠(6mg) 1回1錠 1日2回 朝食後
1サイクル目day1のみ 内服:モンテルカスト(10mg) 1日1錠 1日1回 朝食後