

対象疾患	レジメン名称	投与サイクル	投与間隔
多発性骨髄種	s.c.DLd	PDまで	4週間

【投与スケジュール】

【1-2サイクル目】s.c.Dara 1800mg/body d1,8,15,22+Len 25mg/body d1-21+DEX 20mg/body d1,2,8,9,15,16,22,23 q4w

※75歳以上の場合DEX20mg/body d1,8,15,22に減量

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1	d2	d8	d9	d15	d16	d21	d22	d23	
内服)①	レブラミド	25 mg/body			d1-21まで連日内服									
内服)②	レナデックス	20 mg/body		ダラキューロ投与日: 投与1-3時間前に内服	○	○	○	○	○	○		○	○	
皮下注	ダラキューロ	1800 mg/body	5分		○		○		○			○		
内服)③	ロキソプロフェン			3錠 分3 毎食後	○		○		○			○		
内服)④	d-クロルフェニラミン徐放錠			2錠 分2 朝・夕食後	○		○		○			○		
内服)⑤	モンテルカスト			1錠 分1 朝食後	○									

【3-6サイクル目】s.c.Dara 1800mg/body d1,15+Len 25mg/body d1-21+DEX 20mg/body d1,2,15,16+DEX40mg/body d8,22 q4w

※75歳以上の場合DEX20mg/body d1,8,15,22に減量

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1	d2	d8	d9	d15	d16	d21	d22	
内服)①	レブラミド	25 mg/body			d1-21まで連日内服								
内服)②	レナデックス	20 mg/body 40 mg/body	(d1,2,15,16) (d8,22)	ダラキューロ投与日: 投与1-3時間前に内服	○	○	○		○	○		○	
皮下注	ダラキューロ	1800 mg/body	5分		○				○				
内服)③	ロキソプロフェン			3錠 分3 毎食後	○				○				
内服)④	d-クロルフェニラミン徐放錠			2錠 分2 朝・夕食後	○				○				

【7サイクル目以降】s.c.Dara 1800mg/body d1+Len 25mg/body d1-21+DEX 20mg/body d1,2+DEX40mg/body d8,15,22 q4w

※75歳以上の場合DEX20mg/body d1,8,15,22に減量

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1	d2	d8	d9	d15	d16	d21	d22	
内服)①	レブラミド	25 mg/body			d1-21まで連日内服								
内服)②	レナデックス	20 mg/body 40 mg/body	(d1,2) (d8,15,22)	ダラキューロ投与日: 投与1-3時間前に内服	○	○	○		○			○	
皮下注	ダラキューロ	1800 mg/body	5分		○								
内服)③	ロキソプロフェン			3錠 分3 毎食後	○								
内服)④	d-クロルフェニラミン徐放錠			2錠 分2 朝・夕食後	○								

【備考】

ダラキューロ投与日のみ 内服:ロキソプロフェン(60mg) 1回1錠 1日3回 毎食後、d-クロルフェニラミン徐放錠(6mg) 1回1錠 1日2回 朝夕食後

1サイクル目day1のみ 内服:モンテルカスト(10mg) 1日1錠 1日1回 朝食後