

対象疾患	レジメン名称	投与サイクル	投与間隔
多発性骨髄種	s.c.DVd	PDまで	1-8サイクル:3週間 9サイクル以降:4週間

【投与スケジュール】

【1-3サイクル目】 s.c.Dara 1800mg/body d1.8.15+Bor 1.3mg/m<sup>2</sup> d1.4.8.11+DEX 20mg/body d1.2.4.5.8.9.11.12.15 q3w

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1	d2	d4	d5	d8	d9	d11	d12	d15
内服)①	レナデックス	20 mg/body		ダラキューロ投与日: 投与1-3時間前に内服	○	○	○	○	○	○	○	○	○
皮下注)①	ベルケイド	1.3 mg/m <sup>2</sup>			○		○		○		○		
皮下注)②	ダラキューロ	1800 mg/body	5分		○				○				○
内服)②	ロキソプロフェン			3錠 分3 毎食後	○				○				○
内服)③	d-クロルフェニラミン徐放錠			2錠 分2 朝・夕食後	○				○				○
内服)④	モンテルカスト			1錠 分1 朝食後	○								

【4-8サイクル目】 s.c.Dara 180mg/body d1+Bor 1.3mg/m<sup>2</sup> d1.4.8.11+DEX 20mg/body d1.2.4.5.8.9.11.12 q3w

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1	d2	d4	d5	d8	d9	d11	d12
内服)①	レナデックス	20 mg/body		ダラキューロ投与日: 投与1-3時間前に内服	○	○	○	○	○	○	○	○
皮下注)①	ベルケイド	1.3 mg/m <sup>2</sup>			○		○		○		○	
皮下注)②	ダラキューロ	1800 mg/body	5分		○							
内服)②	ロキソプロフェン			3錠 分3 毎食後	○							
内服)③	d-クロルフェニラミン徐放錠			2錠 分2 朝・夕食後	○							

【9サイクル目以降】 s.c.Dara 1800mg/body d1+DEX 20mg/body d1 q4w

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1
内服)①	レナデックス	20 mg/body		ダラキューロ投与日: 投与1-3時間前に内服	○
皮下注)①	ダラキューロ	1800 mg/body			○
内服)②	ロキソプロフェン			3錠 分3 毎食後	○
内服)③	d-クロルフェニラミン徐放錠			2錠 分2 朝・夕食後	○

【備考】

ダラキューロ投与日のみ 内服:ロキソプロフェン(60mg) 1回1錠 1日3回 毎食後、d-クロルフェニラミン徐放錠(6mg) 1回1錠 1日2回 朝夕食後

1サイクル目day1のみ 内服:モンテルカスト(10mg) 1日1錠 1日1回 朝食後