

対象疾患	レジメン名称	投与サイクル	投与間隔
多発性骨髄種	s.c.DVMP	PDまで	1-9サイクル:6週間 10サイクル以降:4週間

【投与スケジュール】

【1サイクル目】s.c.Dara 1800mg/body d1.8.15.22.29.36+Bor 1.3mg/rf d1.4.8.11.22.25.29.32+L-PAM 9mg/rf d1-4+PSL 60mg/rf d2-4+DEX 20mg/body d1.8.15.22.29.36 q6w

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1	d4	d8	d11	d15	d22	d25	d29	d32	d36
内服)①	レナデックス	20 mg/body		ダラキューロ投与日: 投与1-3時間前に内服	○		○		○	○		○		○
内服)②	アルケラン	9 mg/rf		1日1回		d1-4								
内服)③	ブレドニゾン	60 mg/rf		1日1回		d2-4								
皮下注)①	ベルケイド	1.3 mg/rf			○	○	○	○		○	○	○	○	
皮下注)②	ダラキューロ	1800 mg/body	5分		○		○		○	○		○		○
内服)④	ロキソプロフェン			3錠 分3 毎食後	○		○		○	○		○		○
内服)⑤	d-クロルフェニラミン徐放錠			2錠 分2 朝・夕食後	○		○		○	○		○		○
内服)⑥	モンテルカスト			1錠 分1 朝食後	○									

【2-9サイクル目】s.c.Dara 1800mg/body d1.22+Bor 1.3mg/rf d1.8.22.29+L-PAM 9mg/rf d1-4+PSL 60mg/rf d2-4+DEX 20mg/body d1.22 q6w

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1	d4	d8	d11	d15	d22	d25	d29
内服)①	レナデックス	20 mg/body		ダラキューロ投与日: 投与1-3時間前に内服	○					○		
内服)②	アルケラン	9 mg/rf		1日1回		d1-4						
内服)③	ブレドニゾン	60 mg/rf		1日1回		d2-4						
皮下注)①	ベルケイド	1.3 mg/rf			○		○			○		○
皮下注)②	ダラキューロ	1800 mg/body	5分		○					○		
内服)④	ロキソプロフェン			3錠 分3 毎食後	○					○		
内服)⑤	d-クロルフェニラミン徐放錠			2錠 分2 朝・夕食後	○					○		

【10サイクル目以降】s.c.Dara 1800mg/body d1+DEX 20mg/body d1 q4w

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1
内服)①	レナデックス	20 mg/body		ダラキューロ投与日: 投与1-3時間前に内服	○
皮下注)①	ダラキューロ	1800 mg/body			○
内服)②	ロキソプロフェン			3錠 分3 毎食後	○
内服)③	d-クロルフェニラミン徐放錠			2錠 分2 朝・夕食後	○

【備考】

ダラキューロ投与日のみ 内服:ロキソプロフェン(60mg)1回1錠 1日3回 毎食後、d-クロルフェニラミン徐放錠(6mg)1回1錠 1日2回 朝夕食後
1サイクル目day1のみ 内服:モンテルカスト(10mg)1日1錠 1日1回 朝食後