

対象疾患	レジメン名称	投与サイクル	投与間隔
悪性リンパ腫	A+AVD	最大8回	4週間

【投与スケジュール】

BV 1.2mg/kg +DXR 25mg/m²+VBL 6mg/m²+DTIC 375mg/m²: d1.15 q4w

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1	d15
末梢メイン)A	ソリタT3 (500ml)	1 V	5時間		○	○
末梢側管)①	アロキシバグ デカドロン(6.6mg)	1 P 1 V	30分		○	○
末梢側管)②	ダカルバジン 生理食塩液(100ml)	375 mg/m² 1 V	1時間		○	○
末梢側管)③	ドキシソルピシン 5%ブドウ糖 (50ml)	25 mg/m² 1 V	15分		○	○
末梢側管)④	エクザール 生理食塩液 (50ml)	6 mg/m² 1 V	15分	最大量10mg	○	○
末梢側管)⑤	生理食塩液(50ml)	1 V	15分		○	○
末梢側管)⑥	アドセトリス 生理食塩液 (50ml)	1.2 mg/kg 1 V	30分		○	○
末梢側管)⑦	生理食塩液(50ml)	1 V	15分		○	○

点滴順序:メイン)A → 側管)① → 側管)② → 側管)③ → 側管)④ → 側管)⑤ → 側管)⑥ → 側管)⑦

【備考】