

対象疾患	レジメン名称	投与サイクル	投与間隔
悪性リンパ腫 DLBCL	BR120	6回	3週間

【投与スケジュール】

Rituximab (375mg/m²): d1+Bendamustine (120mg/m²):d2, 3 q3w

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1	d2-3
末梢メイン)A	ソリター-T3 (500ml)	1 V	6時間		○	
末梢メイン)B	ソルデム3A (200mL)	1 V	3時間			○
末梢側管)①	グラニセトロン デカドロン(6.6mg)	1 P 1 V	30分			○
末梢側管)②	リツキシマブ 5%ブドウ糖 (500ml)	375 mg/m² 1 V	投与時間は備考 参照		○	
末梢側管)③	トレアキシシ 生理食塩液 (250ml)	120 mg/m² 1 V	1時間			○

点滴順序: d1 メイン)A → 側管)②

d2,3 メイン)B → 側管)① → 側管)③

【備考】

リツキシマブ投与日のみ 内服:ロキソプロフェン(60mg) 1回1錠 1日3回 毎食後、d-ククロルフェニラミン徐放錠(6mg) 1回1錠 1日2回 朝夕食後

リツキシマブの投与速度: 18mL/hrで開始,30分後36mL/hr,1hr後54mL/hr,1.5hr後72mL/hr,2hr後90mL/hr,2.5hr後108mL/hr,3hr後126mL/hr,3.5hr後144mL/hr

2回目以降リツキシマブの投与速度は50mL/hr,30分後200mL/hrで1時間30分投与可

トレアキシシの投与速度は1時間に加えて10分投与可