

対象疾患	レジメン名称	投与サイクル	投与間隔
多発性骨髄腫	IsaDexa	PDまで	4週間

【投与スケジュール】

【1サイクル】Isatuximab 20mg/kg d1,8,15,22 ,Dexamethasone 40mg/body d1,8,15,22 q4w

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1	d8	d15	d21	d22
末梢(メイン)A	生理食塩液 (100ml)	1 V	5時間		○	○	○		○
末梢側管)①	デカドロン(6.6mg)	5 V	15分		○	○	○		○
	ガスター(20mg)	1 V							
	生理食塩液 (100ml)	1 V							
末梢側管)②	サークリサ	20 mg/kg	投与時間は備考参照		○	○	○		○
	生理食塩液 (250ml)	1 V							

点滴順序:メイン)A → 側管)① → 側管)②

【2サイクル目以降】Isatuximab 20mg/kg d1,15 ,Dexamethasone 40mg/body d1,8,15,22 q4w

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1	d8	d15	d21	d22
末梢(メイン)A	生理食塩液 (100ml)	1 V	5時間		○		○		
末梢側管)①	デカドロン(6.6mg)	5 V	15分		○		○		
	ガスター(20mg)	1 V							
	生理食塩液 (100ml)	1 V							
末梢側管)②	サークリサ	20 mg/kg	投与時間は備考参照		○		○		
	生理食塩液 (250ml)	1 V							
内服②	レナデックス(4mg/T)	10 T		10T 分1		○			○

点滴順序:メイン)A → 側管)① → 側管)②

【備考】

サークリサ投与日 内服:ロキソプロフェン(60mg) 1回1錠 1日3回 毎食後、d-クロルフェニラミン徐放錠(6mg) 1回1錠 1日2回 朝夕食後

1サイクル目day1のみ 内服:モンテルカスト(10mg) 1日1錠 1日1回 朝食後

【初回投与、体重50kg以下】44mL/hrで開始,1hr後56mL/hr,1.5hr後69mL/hr,2hr後81mL/hr,2.5hr後94mL/hr,3hr後100mL/hr

【2回目以降、体重50kg以下】44mL/hrで開始,1hr後69mL/hr,1.5hr後94mL/hr,2hr後100mL/hr

【初回投与、体重51kg以上70kg以下】31mL/hrで開始,1hr後40mL/hr,1.5hr後49mL/hr,2hr後58mL/hr,2.5hr後67mL/hr,3hr後71mL/hr

【2回目以降、体重51kg以上70kg以下】31mL/hrで開始,1hr後49mL/hr,1.5hr後67mL/hr,2hr後71mL/hr

【初回投与、体重71kg以上100kg以下】22mL/hrで開始,1hr後28mL/hr,1.5hr後34mL/hr,2hr後41mL/hr,2.5hr後47mL/hr,3hr後50mL/hr

【2回目以降、体重71kg以上100kg以下】22mL/hrで開始,1hr後34mL/hr,1.5hr後47mL/hr,2hr後50mL/hr

75歳以上はデキサメタゾン20mg/bodyへ減量