対象疾患	レジメン名称	投与サイクル	投与間隔
多発性骨髄腫	IsaKd	PDまで	4週間

【投与スケジュール】

【1サイクル】Isatuximab 10mg/kg d1,8,15,22 ,Carfilzomib 56mg/㎡ d1,2,8,9,15,16 ,Dexamethasone 20mg/body d1,2,8,9,15,16,22,23 q4w

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1	d2	d8	d9	d15	d16	d22	d23
末梢ﾒｲﾝ)A	生理食塩液（100ml）	1 V	5時間		○		○		○		○	
末梢側管)①	デカドロン(6.6mg)	2.5 V	15分		○		○		○		○	
	ガスター(20mg)	1 V										
	生理食塩液（100ml）	1 V										
末梢側管)②	サークリサ	10 mg/kg	投与時間は備考参照		○		○		○		○	
	生理食塩液（250ml）	1 V										
末梢側管)③	5%ブドウ糖(50ml)	1 V	全開		○		○		○			
末梢ﾒｲﾝ)B	5%ブドウ糖(50ml)	1 V	1時間			○		○		○		
末梢側管)④	カイプロリス	56 mg/㎡	30分	d1,2は5%ブドウ糖液は50mL	○	○	○	○	○	○		
	5%ブドウ糖(250ml)	0.4 V										
末梢側管)⑤	5%ブドウ糖(50ml)	1 V	全開		○		○		○			
内服	レナデックス	20 mg/body		1日1回		○		○		○		○

d1,8,15 点滴順序：メイン)A → 側管)① → 側管)② → 側管)③ → 側管)④ → 側管)⑤

d2,9,16 点滴順序：メイン)B → 側管)④

d22 点滴順序：メイン)A → 側管)① → 側管)②

【2サイクル目以降】Isatuximab 10mg/kg d1,15 ,Carfilzomib 56mg/㎡ d1,2,8,9,15,16 ,Dexamethasone 20mg/body d1,2,8,9,15,16,22,23 q4w

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1	d2	d8	d9	d15	d16	d22	d23
末梢ﾒｲﾝ)A	生理食塩液（100ml）	1 V	5時間		○				○			
末梢側管)①	デカドロン(6.6mg)	2.5 V	15分		○				○			
	ガスター(20mg)	1 V										
	生理食塩液（100ml）	1 V										
末梢側管)②	サークリサ	10 mg/kg	投与時間は備考参照		○				○			
	生理食塩液（250ml）	1 V										
末梢側管)③	5%ブドウ糖(50ml)	1 V	全開		○				○			
末梢ﾒｲﾝ)B	5%ブドウ糖(50ml)	1 V	1時間			○	○	○		○		
末梢側管)④	カイプロリス	56 mg/㎡	30分	d1,2は5%ブドウ糖液は50mL	○	○	○	○	○	○		
	5%ブドウ糖(250ml)	0.4 V										
末梢側管)⑤	5%ブドウ糖(50ml)	1 V	全開		○				○			
内服	レナデックス	20 mg/body		1日1回		○	○	○		○	○	○

d1,15 点滴順序：メイン)A → 側管)① → 側管)② → 側管)③ → 側管)④ → 側管)⑤

d2,8,9,16 点滴順序：メイン)B → 側管)④

【備考】

サークリサ投与日のみ 内服：ロキソプロフェン（60mg） 1回1錠 1日3回 毎食後、d-クロルフェニラミン徐放錠（6mg） 1回1錠 1日2回 朝夕食後

1サイクル目day1のみ 内服：モンテルカスト（10mg）1日1錠 1日1回 朝食後

【初回投与、体重70kg以下】63mL/hrで開始,1hr後80mL/hr,1.5hr後98mL/hr,2hr後116mL/hr,2.5hr後134mL/hr

【2回目以降、体重70kg以下】63mL/hrで開始,1hr後98mL/hr,1.5hr後134mL/hr,2hr後143mL/hr

【初回投与、体重71kg以上100kg以下】44mL/hrで開始,1hr後56mL/hr,1.5hr後69mL/hr,2hr後81mL/hr,2.5hr後94mL/hr,3hr後100mL/hr

【2回目以降、体重71kg以上100kg以下】44mL/hrで開始,1hr後69mL/hr,1.5hr後94mL/hr,2hr後100mL/hr