

対象疾患	レジメン名称	投与サイクル	投与間隔
多発性骨髄腫	IsaPD	PDまで	4週間

【投与スケジュール】

【1サイクル】Isatuximab 10mg/kg d1,8,15,22_Pomalidomide 4mg/body d1-21_Dexamethasone 40mg/body d1,8,15,22 q4w

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1	d8	d15	d21	d22
末梢メイン)A	生理食塩液 (100ml)	1 V			○	○	○		○
末梢側管)①	デカドロン(6.6mg)	5 V	15分		○	○	○		○
	ガスター(20mg)	1 V							
	生理食塩液 (100ml)	1 V							
末梢側管)②	サークリサ	10 mg/kg	投与時間は備考参照		○	○	○		○
	生理食塩液 (250ml)	1 V							
内服	ポマリスト(4mg/Cap)	1 Cap		1Cap 分1	d1-21まで連日内服				

点滴順序:メイン)A → 側管)① → 側管)②

【2サイクル目以降】Isatuximab 10mg/kg d1,15_Pomalidomide 4mg/body d1-21_Dexamethasone 40mg/body d1,8,15,22 q4w

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1	d8	d15	d21	d22
末梢メイン)A	生理食塩液 (100ml)	1 V			○		○		
末梢側管)①	デカドロン(6.6mg)	5 V	15分		○		○		
	ガスター(20mg)	1 V							
	生理食塩液 (100ml)	1 V							
末梢側管)②	サークリサ	10 mg/kg	投与時間は備考参照		○		○		
	生理食塩液 (250ml)	1 V							
内服①	ポマリスト(4mg/Cap)	1 Cap		1Cap 分1	d1-21まで連日内服				
内服②	レナデックス(4mg/T)	10 T		10T 分1		○			○

点滴順序:メイン)A → 側管)① → 側管)②

【備考】

サークリサ投与日 内服:ロキソプロフェン(60mg) 1回1錠 1日3回 毎食後、d-クロルフェニラミン徐放錠(6mg) 1回1錠 1日2回 朝夕食後

1サイクル目day1のみ 内服:モンテルカスト(10mg)1日1錠 1日1回 朝食後

【初回投与、体重70kg以下】63mL/hrで開始,1hr後80mL/hr,1.5hr後98mL/hr,2hr後116mL/hr,2.5hr後134mL/hr

【2回目以降、体重70kg以下】63mL/hrで開始,1hr後98mL/hr,1.5hr後134mL/hr,2hr後143mL/hr

【初回投与、体重71kg以上90kg以下】48mL/hrで開始,1hr後62mL/hr,1.5hr後76mL/hr,2hr後90mL/hr,2.5hr後104mL/hr,3hr後111mL/hr

【2回目以降、体重71kg以上90kg以下】48mL/hrで開始,1hr後76mL/hr,1.5hr後104mL/hr,2hr後111mL/hr

75歳以上はデキサメタゾン20mg/bodyへ減量