

対象疾患	レジメン名称	投与サイクル	投与間隔
多発性骨髄腫	s.c.DaraPd	PDまで	4週間

【投与スケジュール】

【1-2サイクル目】 s.c.Dara 1800mg/body d1.8.15.22+Pom 4mg/body d1-21+DEX 40mg/body d1.8.15.22 q4w

※75歳以上の場合DEX20mg/bodyに減量

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1	d8	d15	d21	d22
内服)①	ボマリスト(4mg/Cap)	1 Cap		1Cap 分1	d1-21まで連日内服				
内服)②	レナデックス	20 mg/body		ダラキューロ投与日: 投与1-3時間前に内服	○	○	○		○
皮下注	ダラキューロ	1800 mg/body	5分		○	○	○		○
内服)③	ロキソプロフェン			3錠 分3 毎食後	○	○	○		○
内服)④	d-クロルフェニラミン徐放錠			2錠 分2 朝・夕食後	○	○	○		○
内服)⑤	モンテルカスト			1錠 分1 朝食後	○				

【3-6サイクル目】 s.c.Dara 1800mg/body d1.15+Pom 4mg/body d1-21+DEX 40mg/body d1.8.15.22 q4w

※75歳以上の場合DEX20mg/bodyに減量

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1	d8	d15	d21	d22
内服)①	ボマリスト(4mg/Cap)	1 Cap		1Cap 分1	d1-21まで連日内服				
内服)②	レナデックス	40 mg/body		ダラキューロ投与日: 投与1-3時間前に内服	○	○	○		○
皮下注	ダラキューロ	1800 mg/body	5分		○		○		
内服)③	ロキソプロフェン			3錠 分3 毎食後	○		○		
内服)④	d-クロルフェニラミン徐放錠			2錠 分2 朝・夕食後	○		○		

【7サイクル目以降】 s.c.Dara 1800mg/body d1+Pom 4mg/body d1-21+DEX 40mg/body d1.8.15.22 q4

※75歳以上の場合DEX20mg/bodyに減量

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1	d8	d15	d21	d22
内服)①	ボマリスト(4mg/Cap)	1 Cap		1Cap 分1	d1-21まで連日内服				
内服)②	レナデックス	40 mg/body		ダラキューロ投与日: 投与1-3時間前に内服	○	○	○		○
皮下注	ダラキューロ	1800 mg/body	5分		○				
内服)③	ロキソプロフェン			3錠 分3 毎食後	○				
内服)④	d-クロルフェニラミン徐放錠			2錠 分2 朝・夕食後	○				

【備考】

ダラキューロ投与日のみ 内服:ロキソプロフェン(60mg) 1回1錠 1日3回 毎食後、d-クロルフェニラミン徐放錠(6mg) 1回1錠 1日2回 朝夕食後

1サイクル目day1のみ 内服:モンテルカスト(10mg)1日1錠 1日1回 朝食後