

対象疾患	レジメン名称	投与サイクル	投与間隔
びまん性大細胞型B細胞リンパ腫	pola-R-CHP	6サイクル	3週間

【投与スケジュール】

Rituxmab 375mg/m<sup>2</sup> d1 + Polatuzmab Vedotin 1.8mg/kg d2 + cyclophosphamide 750mg/m<sup>2</sup> d2 + doxorubicin 50mg/m<sup>2</sup> d2 + prednisolone 60mg/m<sup>2</sup> d2-6. q3w

【1サイクル目】

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1	d2
メイン(A)	ソリタT3(500mL/V)	1 V	8時間		○	○
側管①	5%ブドウ糖液(250mL/V) リツキシマブ	0.8 V 375 mg/m <sup>2</sup>	備考参照		○	
側管②	生理食塩水(100mL/V) ポライビー	1 V 1.8 mg/kg	1時間30分			○
側管③	生理食塩水(50mL/V)	1 V	15分			○
側管④	アロキシバッグ	1 V	30分			○
側管⑤	5%ブドウ糖液(50mL/V) ドキシソルピシン	1 V 50 mg/m <sup>2</sup>	15分			○
側管⑥	生理食塩水(500mL/V) エンドキサン	1 V 750 mg/m <sup>2</sup>	2時間			○

点滴順序: d1 (A)→①.d2 (A)→②→③→④→⑤→⑥

【備考】

内服:ロキソプロフェン 1回1錠 1日3回 リツキシマブ・ポライビー投与日に内服

内服:ペボタステン 1回1錠 1日2回 リツキシマブ・ポライビー投与日に内服

内服:プレドニゾン60mg/m<sup>2</sup> 原則1日1回朝食後内服(但し分割も可)※最大100mg/body

リツキシマブの投与速度:18mL/hrで開始、アレルギー症状なくバイタル安定していれば、30分毎に36mL/hr→54mL/hr→72mL/hr→90mL/hr→108mL/hr→126mL/hr→144mL/hrへup可

【2-6サイクル目】

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1	d2
メイン(A)	ソリタT3(500mL/V)	1 V	8時間		○	○
側管①	デカドロン(6.6mg/V) 生食(50ml/V)	2.5 V 1 V	15分	※2コース目のみ、SDIが問題なく投与できれば3コース目以降省略可	○	
側管②	5%ブドウ糖液(250mL/V) リツキシマブ	0.01 V 375 mg/m <sup>2</sup>	備考参照		○	
側管③	生理食塩水(100mL/V) ポライビー	1 V 1.8 mg/kg	30分			○
側管④	生理食塩水(50mL/V)	1 V	15分			○
側管⑤	アロキシバッグ	1 V	30分			○
側管⑥	5%ブドウ糖液(50mL/V) ドキシソルピシン	1 V 50 mg/m <sup>2</sup>	15分			○
側管⑦	生理食塩水(500mL/V) エンドキサン	1 V 750 mg/m <sup>2</sup>	2時間			○

点滴順序: d1 (A)→①→②.d2 (A)→③→④→⑤→⑥→⑦

【備考】

内服:ロキソプロフェン 1回1錠 1日3回 リツキシマブ・ポライビー投与日に内服

内服:ペボタステン 1回1錠 1日2回 リツキシマブ・ポライビー投与日に内服

内服:プレドニゾン60mg/m<sup>2</sup> 原則1日1回朝食後内服(但し分割も可)※最大100mg/body

リツキシマブの投与速度:50mL/hrで開始。30分後に200mL/hrにあげる