

対象疾患	レジメン名称	投与サイクル	投与間隔
非小細胞肺がん	CBDCA+nab-PTX+Pembrolizumab	4回	3週間

【投与スケジュール】

Pembrolizumab 200mg/body d1 + CBDCA (AUC 6) d1 + nab-PTX 100mg/m² d1,8,15 q3w

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1	d8	d15
末梢メイン)A	生理食塩液 (100ml)	1 V	2時間40分		○		
末梢メイン)B	生理食塩水(100mL)	1 V	1時間			○	○
末梢側管)①	キイトルーダ	200 mg/body	30分		○		
	生理食塩水(100mL)						
末梢側管)②	アロキシバグ	1 P	10分		○		
	デカドロン(6.6mg)	1 V					
末梢側管)③	デカドロン(6.6mg)	1 V	10分			○	○
	生理食塩水(50mL)	1 V					
末梢側管)④	生理食塩水(50L)	1 V	10分		○	○	○
末梢側管)⑤	アブラキサン	100 mg/m ²	30分		○	○	○
	生理食塩液 (100ml)	0.01 V					
末梢側管)⑥	生理食塩水(50mL)	1 V	10分		○	○	○
末梢側管)⑦	カルボプラチン	AUC 6	1時間		○		
	生理食塩液 (250ml)	1 V					

点滴順序:d1 メイン)A → 側管)① → 側管)② → 側管)④ → 側管)⑤ → 側管)⑥ → 側管)⑦

d8 メイン)B → 側管)③ → 側管)④ → 側管)⑤ → 側管)⑥

d15 メイン)B → 側管)③ → 側管)④ → 側管)⑤ → 側管)⑥

【備考】

内服:アプレピタント(125mg) 1回1錠 1日1回 治療前 day1, アプレピタント(80mg) 1回1錠 1日1回 午前中 day2,3