対象疾患	レジメン名称	投与サイクル	投与間隔
非小細胞肺がん	CBDCA+PEM+Pembrolizumab	4回	3週間

【投与スケジュール】

CBDCA (AUC 5) + PEM 500mg/㎡ + Pembrolizumab 200mg/body d1 q3w

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1
末梢ﾒｲﾝ)A	生理食塩液 (100ml)	1 V	2時間		○
末梢側管)①	キイトルーダ	200 mg/body	30分		○
	生理食塩水(100mL)	1 V			
末梢側管)②	アロキシバッグ	1 P	10分		○
	デカドロン(6.6mg)	1 V			
末梢側管)③	アリムタ	500 mg/㎡	10分		○
	生理食塩液(250ml)	1 V			
末梢側管)④	カルボプラチン	5 AUC	1時間		○
	生理食塩液 (250ml)	1 V			

点滴順序:ﾒｲﾝ)A → 側管)① → 側管)② → 側管)③ → 側管)④

【備考】

内服:ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ(125mg) 1回1錠 1日1回 治療前 day1, ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ(80mg) 1回1錠 1日1回 午前中 day2,3