

対象疾患	レジメン名称	投与サイクル	投与間隔
非小細胞肺癌	CDDP+PEM+Atezolizumab	4回	3週間

【投与スケジュール】

CDDP 75mg/㎡ + PEM 500mg/㎡ + Atezolizumab 1200mg/㎡ d1 q3w

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1	d2	d3
末梢メインA-①	生理食塩液 (500ml)	1 V	1時間		○		
末梢メインA-②	生理食塩液 (500ml)	1 V	1時間		○		
	硫酸マグネシウム(1mEq/ml)	8 mL					
末梢メインA-③	ソリタT3 (500ml)	1 V	1時間		○		
末梢メインA-④	生理食塩液 (500ml)	1 V	1時間		○		
末梢メインA-⑤	ソリタT3(500mL)	1 V	1時間		○		
末梢メインB-①	ラクテック(500ml)	1 V	1時間			○	
末梢メインB-②	ソリタT3(500mL)	1 V	1時間			○	
末梢メインB-③	ラクテック (500ml)	1 V	1時間			○	
末梢メインC-①	ラクテック(500ml)	1 V	1時間				○
末梢メインC-②	ラクテック(500ml)	1 V	1時間				○
末梢側管)①	テセントリク	1200 mg/body	1時間	30分(2回目以降)	○		
	生理食塩液 (100ml)	1 V					
末梢側管)②	アロキシバッグ	1 P	10分		○		
	デカドロン(6.6mg)	1.5 V					
末梢側管)③	デカドロン(6.6mg)	1 V	10分			○	
	生理食塩水(50mL)	1 V					
末梢側管)④	デカドロン(6.6mg)	0.5 V	10分				○
	生理食塩水(50mL)	1 V					
末梢側管)⑤	ブロイメンド	1 V	30分		○		
	生理食塩水(100mL)	1 V					
末梢側管)⑥	アリムタ	500 mg/㎡	10分		○		
	生理食塩水(100mL)	1 V					
末梢側管)⑦	マンニトールS(300mL)	0.67 V	30分		○		
末梢側管)⑧	シスプラチン	75 mg/㎡	1時間		○		
	生理食塩水(250mL)	0.01 V					
末梢側管)⑨	ラシックス	1 A	10分		○		
	生理食塩水(50mL)	1 V					

点滴順序: day1 メイン)A → 側管)① → 側管)② → 側管)⑤→ 側管)⑥ → 側管)⑦→ 側管)⑧→ 側管)⑨

day2 メイン)B → 側管)③

day3 メイン)C → 側管)④

(ただし、外来の場合はd2,d3を省略)

【備考】

内服:デカドロン(0.5mg) 1回4錠 1日2回 朝食後 day4,5

(ただし、外来の場合はd2～d5に内服)

内服:パネヒタ 1回1g 1日1回 朝食後

筋注:フレズミンS 1A 9週毎