

対象疾患	レジメン名称	投与サイクル	投与間隔
非小細胞肺癌	【術前】CBDCA+PEM+Nivolumab	最大3回	3週間

【投与スケジュール】

CBDCA (AUC 5) + PEM 500mg/m² + Nivolumab 360mg/body d1 q3w

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1
末梢メインA	生理食塩液 (100ml)	1 V	1時間30分		○
末梢側管)①	オブジーボ	360 mg/body	30分		○
	生理食塩水(100mL)	1 V			
末梢側管)②	アロキシバッグ	1 P	10分		○
	デカドロン(6.6mg)	1 V			
末梢側管)③	アリムタ	500 mg/m²	10分		○
	生理食塩液 (250ml)	1 V			
末梢側管)④	カルボプラチン	5 AUC	1時間		○
	生理食塩液 (250ml)	1 V			

点滴順序:メインA → 側管)① → 側管)② → 側管)③ → 側管)④

【備考】

内服:アプレピタント(125mg) 1回1錠 1日1回 治療前 day1, アプレピタント(80mg) 1回1錠 1日1回 午前中 day2,3

内服:バンピタン 1回1g 1日1回 朝食後

筋注:シアノコバラミン 1A 9週毎