

対象疾患	レジメン名称	投与サイクル	投与間隔
非小細胞肺癌	【術前】CDDP+PEM+Nivolumab	3回	3週間

【投与スケジュール】

**CDDP 75mg/m<sup>2</sup> + PEM 500mg/m<sup>2</sup> + Nivolumab 360mg/m<sup>2</sup> d1 q3w**

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1
末梢メインA-①	生理食塩液 (500ml)	1 V	1時間		○
末梢メインA-②	生理食塩液 (500ml)	1 V	1時間		○
	硫酸マグネシウム(1mEq/mL)	8 mL			
末梢メインA-③	ソリタT3 (500ml)	1 V	1時間		○
末梢メインA-④	生理食塩液 (500ml)	1 V	1時間		○
末梢メインA-⑤	ソリタT3(500mL)	1 V	1時間		○
末梢側管)①	<b>オブジーボ</b>	<b>360 mg/body</b>	30分		○
	生理食塩液 (100ml)	1 V			
末梢側管)②	アロキシバグ	1 P	10分		○
	デカドロン(6.6mg)	1.5 V			
末梢側管)⑤	プロイメンド	1 V	30分		○
	生理食塩水(100mL)	1 V			
末梢側管)⑥	<b>ペメレキセド</b>	<b>500 mg/m<sup>2</sup></b>	10分		○
	生理食塩水(100mL)	1 V			
末梢側管)⑦	マンニトールS(300mL)	0.67 V	30分		○
末梢側管)⑧	<b>シスプラチン</b>	<b>75 mg/m<sup>2</sup></b>	1時間		○
	生理食塩水(250mL)	0.01 V			
末梢側管)⑨	ラシックス	1 A	10分		○
	生理食塩水(50mL)	1 V			

点滴順序: day1 メイン)A → 側管)① → 側管)② → 側管)⑤ → 側管)⑥ → 側管)⑦ → 側管)⑧ → 側管)⑨

【備考】

内服:デカドロン(4mg) 1回1錠 1日1回 朝食後 day2-5

内服:バンピタン 1回1g 1日1回 朝食後

筋注:シアノコバラミン 1A 9週毎