

対象疾患	レジメン名称	投与サイクル	投与間隔
乳がん	PER+HER(6mg/kg)+weekly PTX(術後)	18サイクル	3週間

【投与スケジュール】

【1～4サイクル】PTX 80mg/m² d1,8,15 + PER 420mg/body(初回のみ840mg/body) d1 + HER 6mg/kg(初回のみ8mg/kg) d1 q3w

【5～18サイクル】PER 420mg/body d1 + HER 6mg/kg d1 q3w

【1～4サイクル】

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1	d8
末梢メイン)A	生理食塩液 (100ml)	1 V	ラインキープ用	20ml/h	○	○
末梢側管)①	パージェタ	840 mg/body	1時間		初回のみ	
	生理食塩液 (250ml)	1 V				
末梢側管)①'	パージェタ	420 mg/body	30分		2回目～	
	生理食塩液 (250ml)	1 V				
末梢側管)②	生理食塩液 (50ml)	1 V	1時間		○	
末梢側管)③	グラニセロンバッグ	1 P				
	デカドロン(6.6mg)	2 V	30分		○	
	ガスター	1 A				
末梢側管)④	デカドロン(6.6mg)	1.5 V				
	ガスター	1 A	30分			○
	生理食塩水(50ml)	1 V				
末梢側管)⑤	グラニセロンバッグ	1 P	30分			○
末梢側管)⑥	トラスツズマブ(初回)	8 mg/kg	1時間30分		初回のみ	
	生理食塩液 (250ml)	1 V				
末梢側管)⑥'	トラスツズマブ(2回目以降)	6 mg/kg	30分		2回目～	
	生理食塩液 (250ml)	1 V				
末梢側管)⑦	パクリタキセル	80 mg/m ²	1時間		○	○
	生理食塩液 (250ml)	1 V				

点滴順序: day1 メイン)A → 側管)① → 側管)② → 側管)③ → 側管)④ → 側管)⑤

点滴順序: day8,15 メイン)A → 側管)④ → 側管)⑤ → 側管)⑦

【5～18サイクル】

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1
末梢メイン)A	生理食塩液 (100ml)	1 V	ラインキープ用	20ml/h	○
末梢側管)①	パージェタ	420 mg/body	30分		○
	生理食塩液 (250ml)	1 V			
末梢側管)②	トラスツズマブ	6 mg/kg	30分		○
	生理食塩液 (250ml)	1 V			

点滴順序: メイン)A → 側管)① → 側管)②

【備考】

内服: レスタミン(10mg) 1回5錠 1日1回 治療開始時