

対象疾患	レジメン名称	投与サイクル	投与間隔
乳がん	PTX90+BEV	PDまで	4週間

【投与スケジュール】

**PTX 90mg/m<sup>2</sup> d1,8,15 + BEV 10mg/kg d1,15 q4w**

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1	d8	d15
末梢メインA	生理食塩液 (100ml)	1 V	ラインキープ用	20ml/h	○	○	○
末梢側管)①	デカドロン(6.6mg)	1.5 V	15分		○	○	○
	ガスター	1 A					
	生理食塩液 (50ml)	1 V					
末梢側管)②	グラニセトロンバッグ	1 P	30分		○	○	○
末梢側管)③	<b>パクリタキセル</b>	<b>90 mg/m<sup>2</sup></b>	1時間		○	○	○
	生理食塩液 (250ml)	1 V					
末梢側管)④	<b>アバステン</b>	<b>10 mg/kg</b>	1時間30分(初回)	1時間(2回目) 30分(3回目以降)	○		○
	生理食塩液 (100ml)	1 V					

点滴順序: day1,15 メイン)A → 側管)① → 側管)② → 側管)③ → 側管)④

点滴順序: day8 メイン)A → 側管)① → 側管)② → 側管)③

【備考】

内服: レスタミン(10mg) 1回5錠 1日1回 治療開始時