

対象疾患	レジメン名称	投与サイクル	投与間隔
乳がん	(術前)キイトルーダ+weekly CBDCA+PTX	4サイクル	3週間

【投与スケジュール】

Pembrolizumab 200mg/body + CBDCA AUC 1.5 d1.8.15 + PTX 80mg/m² d1.8.15 q3w

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1	d8	d15
末梢メイン)A	生理食塩液(100ml)	1 V	d1 3時間10分 d8,15 2時間40分		○	○	○
末梢側管)①	キイトルーダ 生理食塩液(100ml)	200 mg/body 1 V	30分		○		
末梢側管)②	生理食塩液(50ml) デカドロン(6.6mg) ガスター(20mg)	1 V 1 V 1 A	10分		○	○	○
末梢側管)③	グラニセトロンバッグ	1 V	30分		○	○	○
末梢側管)④	パクリタキセル 生理食塩液(250ml)	80 mg/m² 1 V	1時間		○	○	○
末梢側管)⑤	カルボプラチン 生理食塩液(250ml)	AUC 1.5 1 V	1時間		○	○	○

点滴順序:

d1 メイン)A → 側管)① → 側管)② → 側管)③ → 側管)④ → 側管)⑤

d8,15 メイン)A → 側管)② → 側管)③ → 側管)④ → 側管)⑤

【備考】

内服:レスタミン(10mg) 1回5錠 パクリタキセル投与1時間10分前に内服