

|      |                     |        |      |
|------|---------------------|--------|------|
| 対象疾患 | レジメン名称              | 投与サイクル | 投与間隔 |
| 大腸がん | FOLFIRI+Aflibercept | PDまで   | 2週間  |

【投与スケジュール】

**Aflibercept 4mg/kg d1+CPT-11 150mg/m<sup>2</sup> d1+LV 200mg/m<sup>2</sup> d1+5-FU bolus:400mg/m<sup>2</sup> d1+5-FU infuser:2400mg/m<sup>2</sup> d1-3 q2w**

|         | 薬剤名                              | 数量                                  | 点滴時間    | 備考      | d1 |
|---------|----------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|----|
| 末梢メイン)A | 生理食塩液(100ml)                     | 1 V                                 | ラインキープ用 | 末梢の場合追加 | ○  |
| CVメイン)① | アロキシバッグ<br>デカドロン(6.6mg)          | 1 P<br>1.5 V                        | 30分     |         | ○  |
| CVメイン)② | <b>ザルトラップ</b><br>生理食塩液(100ml)    | <b>4 mg/kg</b><br>1 V               | 1時間     |         | ○  |
| CVメイン)③ | 生理食塩液(50ml)                      | 1 V                                 | 全開      |         | ○  |
| CVメイン)④ | <b>レボホリナート</b><br>5%ブドウ糖液(250ml) | <b>200 mg/m<sup>2</sup></b><br>1 V  | 2時間     |         | ○  |
| CV側管)A  | <b>イリノテカン</b><br>5%ブドウ糖液(250ml)  | <b>150 mg/m<sup>2</sup></b><br>1 V  | 2時間     |         | ○  |
| CVメイン)⑤ | <b>5-FU</b><br>5%ブドウ糖液(50ml)     | <b>400 mg/m<sup>2</sup></b><br>1 V  | 全開      | 全開投与    | ○  |
| CVメイン)⑥ | <b>5-FU</b><br>生理食塩液(20ml)       | <b>2400 mg/m<sup>2</sup></b><br>1 V | 46時間    |         | ○  |

点滴順序:メイン)A → メイン)① → メイン)② → メイン)③ → メイン)④+側管)A → メイン)⑤ → メイン)⑥

【備考】

内服:アプレピタント(125mg) 1回1錠 1日1回 治療前 day1, アプレピタント(80mg) 1回1錠 1日1回 午前中 day2,3