対象疾患	レジメン名称	投与サイクル	投与間隔
大腸がん	Panitumumab+FOLFIRI	PDまで	2週間

【投与スケジュール】

Panitumumab 6mg/kg d1+CPT-11 150mg/㎡ d1+LV 200mg/㎡ d1+5-FU bolus:400mg/㎡ d1+5-FU infuser:2400mg/㎡ d1-3 q2w

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1
CVﾒｲﾝ)A	生理食塩液(100ml)	1 V	90分		○
CV側管)①	ベクティビックス	6 mg/kg	60分		○
	生理食塩液(100ml)	1 V			
CVﾒｲﾝ)B	アロキシバッグ	1 P	30分		○
	デカドロン(6.6mg)	1.5 V			
CVﾒｲﾝ)C	レボホリナート	200 mg/㎡	2時間		○
	5%ブドウ糖液(250ml)	1 V			
CV側管)②	イリノテカン	150 mg/㎡	2時間		○
	5%ブドウ糖液(250ml)	1 V			
CVﾒｲﾝ)D	5-FU	400 mg/㎡	全開	全開投与	○
	5%ブドウ糖液(50ml)	1 V			
CVﾒｲﾝ)E	5-FU	2400 mg/㎡	46時間		○
	生理食塩液(20ml)	1 V			

点滴順序:(メイン)A+側管)①) → メイン)B → (メイン)C＋側管)②) → メイン)D → メイン)E

【備考】

内服:ﾚｽﾀﾐﾝ(10mg) 1回5錠 ﾍﾞｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ投与30分前に内服

内服:ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ(125mg) 1回1錠 1日1回 治療前 day1, ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ(80mg) 1回1錠 1日1回 午前中 day2,3