対象疾患	レジメン名称	投与サイクル	投与間隔
大腸がん	FOLFIRI+Ramucirumab	PDまで	2週間

【投与スケジュール】

RAM 8mg/kg d1+CPT-11 150mg/㎡ d1+LV 200mg/㎡ d1+5-FU bolus:400mg/㎡ d1+5-FU infuser:2400mg/㎡ d1-3 q2w

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1
CVﾒｲﾝ)A	生理食塩液(100ml)	1 V	ラインキープ用		○
CV側管)①	アロキシバッグ	1 P	30分		○
	デカドロン(6.6mg)	1.5 V			
	ポララミン(5mg)	1 A			
CV側管)②	サイラムザ	8 mg/kg	1時間		○
	生理食塩液(250ml)	1 V			
CV側管)③	生理食塩液(50ml)	1 V	全開		○
CVﾒｲﾝ)B	レボホリナート	200 mg/㎡	2時間		○
	5%ブドウ糖液(250ml)	1 V			
CV側管)④	イリノテカン	150 mg/㎡	2時間		○
	5%ブドウ糖液(250ml)	1 V			
CVﾒｲﾝ)C	5-FU	400 mg/㎡	全開	全開投与	○
	5%ブドウ糖液(50ml)	1 V			
CVﾒｲﾝ)D	5-FU	2400 mg/㎡	46時間		○
	生理食塩液(20ml)	1 V			

点滴順序:メイン)A → 側管)① → 側管)② → 側管)③ → メイン)B+側管)④ → メイン)C → メイン)D

【備考】

内服:ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ(125mg) 1回1錠 1日1回 治療前 day1, ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ(80mg) 1回1錠 1日1回 午前中 day2,3