

対象疾患	レジメン名称	投与サイクル	投与間隔
大腸がん	mFOLFOX6	PDまで	2週間

【投与スケジュール】

L-OHP 85mg/m² d1+LV 200mg/m² d1+5-FU bolus:400mg/m² d1+5-FU infuser:2400mg/m² d1-3 q2w

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1
末梢メイン)A	生理食塩液(100ml)	1 V	ラインキープ用	末梢の場合のみ追加	○
CVメイン)①	グラニセロンバッグ	1 P	30分		○
	デカドロン(6.6mg)	1.5 V			
CVメイン)②	レボホリナート	200 mg/m ²	2時間		○
	5%ブドウ糖液(250ml)	1 V			
CV側管)A	オキサリプラチン	85 mg/m ²	2時間		○
	5%ブドウ糖液(250ml)	1 V			
CVメイン)③	5-FU	400 mg/m ²	全開	全開投与	○
	5%ブドウ糖液(50ml)	1 V			
CVメイン)④	5-FU	2400 mg/m ²	46時間		○
	生理食塩液(20ml)	1 V			

点滴順序:メインA) → メイン)① → メイン)②+側管)A → メイン)③ → メイン)④

【備考】

内服:レスタミン(10mg) 1回5錠 オキサリプラチン投与30分前に内服