

対象疾患	レジメン名称	投与サイクル	投与間隔
大腸がん	mFOLFOX6+Bv	PDまで	2週間

【投与スケジュール】

BV 5mg/kg d1+L-OHP 85mg/m² d1+LV 200mg/m² d1+5-FU bolus:400mg/m² d1+5-FU infuser:2400mg/m² d1-3 q2w

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1
末梢メインA	生理食塩液(100ml)	1 V	ラインキープ用	末梢の場合追加	○
CVメイン①	グラニセロンバッグ デカドロン(6.6mg)	1 P 1.5 V	30分		○
CVメイン②	アバステン 生理食塩液(100ml)	5 mg/kg 1 V	1時間30分(初回)	1時間(2回目) 30分(3回目以降)	○
CVメイン③	レボホリナート 5%ブドウ糖液(250ml)	200 mg/m ² 1 V	2時間		○
CV側管)B	オキサリプラチン 5%ブドウ糖液(250ml)	85 mg/m ² 1 V	2時間		○
CVメイン④	5-FU 5%ブドウ糖液(50ml)	400 mg/m ² 1 V	全開	全開投与	○
CVメイン⑤	5-FU 生理食塩液(20ml)	2400 mg/m ² 1 V	46時間		○

点滴順序:メインA) → メイン①) → メイン②) → メイン③)+側管)B → メイン④) → メイン⑤)

【備考】

内服:レスタミン(10mg) 1回5錠 オキサリプラチン投与30分前に内服