

対象疾患	レジメン名称	投与サイクル	投与間隔
大腸がん	Panitumumab+mFOLFOX6	PDまで	2週間

【投与スケジュール】

Panitumumab 6mg/kg d1+L-OHP 85mg/m² d1+LV 200mg/m² d1+5-FU bolus:400mg/m² d1+5-FU infuser:2400mg/m² d1-3 q2w

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1
CVメイン)A	生理食塩液(100ml)	1 V	90分		○
CV側管)①	ベクティビックス	6 mg/kg	60分		○
	生理食塩液(100ml)	1 V			
CVメイン)B	グラニセロンバッグ	1 P	30分		○
	デカドロン(6.6mg)	1.5 V			
CVメイン)C	レボホリナート	200 mg/m ²	2時間		○
	5%ブドウ糖液(250ml)	1 V			
CV側管)②	オキサリプラチン	85 mg/m ²	2時間		○
	5%ブドウ糖液(250ml)	1 V			
CVメイン)D	5-FU	400 mg/m ²	全開	全開投与	○
	5%ブドウ糖液(50ml)	1 V			
CVメイン)E	5-FU	2400 mg/m ²	46時間		○
	生理食塩液(20ml)	1 V			

点滴順序:(メイン)A+側管)① → メイン)B → (メイン)C+側管)② → メイン)D → メイン)E

【備考】

内服:レスタミン(10mg) 1回5錠 ベクティビックス投与30分前に内服