

対象疾患	レジメン名称	投与サイクル	投与間隔
大腸がん	FOLFOXIRI	PDまで	2週間

【投与スケジュール】

L-OHP 85mg/m² d1+CPT-11 165mg/m² d1+LV 200mg/m² d1+5-FU infuser:3200mg/m² d1-3 q2w

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1
CVメイン)①	アロキシバッグ	1 P	15分		○
	デカドロン(6.6mg)	1.5 V			
CVメイン)②	イリノテカン	165 mg/m ²	1時間		○
	5%ブドウ糖液(250ml)	1 V			
CV側管)A	レボホリナート	200 mg/m ²	2時間		○
	5%ブドウ糖液(250ml)	1 V			
CVメイン)③	オキサリプラチン	85 mg/m ²	2時間		○
	5%ブドウ糖液(250ml)	1 V			
CVメイン)④	5-FU	3200 mg/m ²	48時間		○
	生理食塩液(20ml)	1 V			

点滴順序:メイン)① → メイン)② → メイン)③+側管)A → メイン)④

【備考】

内服:レスタミン(10mg) 1回5錠 オキサリプラチン投与30分前に内服

内服:デカドロン(0.5mg) 1回8錠 1日1回 朝食後 day2-5