

| | | | |
|------|----------|--------|------|
| 対象疾患 | レジメン名称 | 投与サイクル | 投与間隔 |
| 大腸がん | XELOX+BV | PDまで | 3週間 |

【投与スケジュール】

BV 7.5mg/kg d1 +L-OHP 130mg/m² d1+capecitabine 2000mg/m² d1夕-d15朝 q3w

| | 薬剤名 | 数量 | 点滴時間 | 備考 | d1 |
|---------|-----------------------------------|------------------------------------|------------|------------------------|----|
| 末梢メイン)A | 生理食塩液(100ml) | 1 V | ラインキープ用 | 末梢の場合投与 | ○ |
| CV側管)① | グラニセロンバッグ デカドロン(6.6mg) | 1 P 1.5 V | 30分 | | ○ |
| CV側管)② | アバスチン 生理食塩液(100ml) | 7.5 mg/kg 1 V | 1時間30分(初回) | 1時間(2回目) 30分(3回目以降) | ○ |
| CV側管)③ | オキサリプラチン 5%ブドウ糖液(500ml) | 130 mg/m² 1 V | 2時間 | | ○ |

点滴順序:メイン)A → 側管)① → 側管)② → 側管)③

【備考】

内服:レスタミン(10mg) 1回5錠 オキサリプラチン投与30分前に内服

内服:カペンチン 投与量は以下を参照とする。1日2回 朝夕食後 Day1夕~Day15朝まで内服