

| | | | |
|------|------------|--------|------|
| 対象疾患 | レジメン名称 | 投与サイクル | 投与間隔 |
| 大腸がん | TAS-102+BV | PDまで | 4週間 |

【投与スケジュール】

ロンサーフ 70mg/m² day1夕-day6朝,d8夕-day13朝+BV 5mg/kg d1.15 q4w

| | 薬剤名 | 数量 | 点滴時間 | 備考 | d1 | d15 |
|---------|---------------|---------|--------|------------|----|-----|
| 末梢メイン)A | 生理食塩液 (100ml) | 1 V | 2時間 | | ○ | ○ |
| 末梢側管)① | アバスチン | 5 mg/kg | 1時間30分 | 1時間(2回目) | ○ | ○ |
| | 生理食塩液 (100ml) | 1 V | | 30分(3回目以降) | | |

点滴順序:メイン)A → 側管)①

【備考】

内服:ロンサーフ投与量は以下を参照とする。1日2回 朝夕食後 Day1夕-Day6朝服用及びDay8夕-Day13朝服用
(Day6夕-Day8朝及びDay13夕-Day29朝は休薬)

ロンサーフ投与量

| 体表面積(m ²) | 1日量(mg/日) | 15mg(錠) | 20mg(錠) |
|-----------------------|-----------|---------|---------|
| 1.07未満 | 70 | 2 | 2 |
| 1.07以上1.23未満 | 80 | 0 | 4 |
| 1.23以上1.38未満 | 90 | 6 | 0 |
| 1.38以上1.53未満 | 100 | 4 | 2 |
| 1.53以上1.69未満 | 110 | 2 | 4 |
| 1.69以上1.84未満 | 120 | 0 | 6 |
| 1.84以上1.99未満 | 130 | 6 | 2 |
| 1.99以上2.15未満 | 140 | 4 | 4 |
| 2.15以上 | 150 | 2 | 6 |