

対象疾患	レジメン名称	投与サイクル	投与間隔
大腸がん	TAS-102+BV(biweekly)	PDまで	4週間

【投与スケジュール】

ロンサーフ 70mg/m² day1タ-day6朝,d15タ-day20朝+BV 5mg/kg d1.15 q4w

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1	d15
末梢メイン)A	生理食塩液 (100ml)	1 V	2時間		○	○
末梢側管)①	アバスチン 生理食塩液 (100ml)	5 mg/kg 1 V	1時間30分	1時間(2回目) 30分(3回目以降)	○	○

点滴順序:メイン)A → 側管)①

【備考】

内服:ロンサーフ投与量は以下を参照とする。1日2回 朝夕食後 Day1タ-Day6朝服用及びDay15タ-Day20朝服用
(Day6タ-Day15朝及びDay20タ-29朝は休業)

ロンサーフ投与量

体表面積(m ²)	1日量(mg/日)	15mg(錠)	20mg(錠)
1.07未満	70	2	2
1.07以上1.23未満	80	0	4
1.23以上1.38未満	90	6	0
1.38以上1.53未満	100	4	2
1.53以上1.69未満	110	2	4
1.69以上1.84未満	120	0	6
1.84以上1.99未満	130	6	2
1.99以上2.15未満	140	4	4
2.15以上	150	2	6