

対象疾患	レジメン名称	投与サイクル	投与間隔
大腸がん	XELIRI+BV	PDまで	3週間

【投与スケジュール】

CPT-11 200mg/m² d1+Bevacizumab 7.5mg/kg d1+Capecitabine 800mg/m²/回、1日2回、d1タ～d15朝 q3w

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1
末梢メイン)A	生理食塩液(100mL)	1 V			○
末梢側管)①	アロキシバッグ デカドロン(6.6mg)	1 P 1.5 V	15分		○
末梢側管)②	アバスチン 生理食塩液(100mL)	7.5 mg/kg 1	1時間30分(初回)	2回目:1時間 3回目以降:30分	○
末梢側管)③	イリノテカン 5%ブドウ糖液(250ml)	200 mg/m² 1 V	1時間30分		○

点滴順序:メイン)A → 側管)① → 側管)② → 側管)③

【備考】

内服:カペシチン 投与量は以下を参照とする。1日2回 朝夕食後 day1タ～day15朝まで内服

カペシチン(300mg/錠)投与量

体表面積(m ²)	投与量(1回量)
1.31未満	900mg/回(3錠)
1.31以上1.69未満	1200mg/回(4錠)
1.69以上2.07未満	1500mg/回(5錠)
2.07以上	1800mg/回(6錠)

アプレピタント(125mg) 1回1錠 1日1回 治療前 day1, アプレピタント(80mg) 1回1錠 1日1回 朝食後 day2,3