

対象疾患	レジメン名称	投与サイクル	投与間隔
胃がん	SOX+Nivolumab	PDまで	3週間

【投与スケジュール】

**Nivolumab 360mg/body + L-OHP 130mg/m<sup>2</sup> d1+ S-1 80mg/m<sup>2</sup> d1夕-d15朝 q3w**

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1
末梢メイン)A	生理食塩液 (100ml)	1 V	3時間		○
末梢側管)①	<b>オブジーボ</b>	<b>360 mg/body</b>	30分		○
	生理食塩液 (100ml)	1 V			
末梢側管)②	生理食塩液 (100ml)	1 V	全開		○
末梢側管)③	グラニセトロンバッグ	1 P	30分		○
	デカドロン(6.6mg)	1.5 V			
末梢側管)④	<b>オキサリプラチン</b>	<b>130 mg/m<sup>2</sup></b>	2時間		○
	5%ブドウ糖液 (500ml)	1 V			

点滴順序:メイン)A → 側管)① → 側管)② → 側管)③ → 側管)④

【備考】

内服:レスタシン(10mg) 1回5錠 オキサリプラチン投与30分前に内服

内服:S1 投与量は以下を参照とする。1日2回 朝夕食後 Day1夕~Day15朝まで内服

S1 投与量

体表面積(m <sup>2</sup> )	投与量
1.25未満	80mg/day
1.25~1.5未満	100mg/day
1.5以上	120mg/day