

対象疾患	レジメン名称	投与サイクル	投与間隔
胃がん	XELOX+Nivolumab	PDまで	3週間

【投与スケジュール】

Nivolumab 360mg/body d1 +L-OHP 130mg/m² d1+capecitabine 2000mg/m² d1タ-d15朝 q3w

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1
末梢メイン)A	生理食塩液 (100ml)	1 V	3時間		○
末梢側管)①	オプジーボ	360 mg/body	30分		○
	生理食塩液(100ml)	1 V			
末梢側管)②	生理食塩液 (100ml)	1 V	全開		○
末梢側管)③	グラニセトロンバッグ	1 P	30分		○
	デカドロン(6.6mg)	1.5 V			
末梢側管)④	オキサリプラチン	130 mg/m²	2時間		○
	5%ブドウ糖液 (500ml)	1 V			

点滴順序:メイン)A → 側管)① → 側管)② → 側管)③ → 側管)④

【備考】

内服:レスタミン(10mg) 1回5錠 オキサリプラチン投与30分前に内服

内服:カヘシピン 投与量は以下を参照とする。1日2回 朝夕食後 Day1夕~Day15朝まで内服

カヘシピン 投与量

体表面積(m ²)	投与量(1回量)
1.36未満	1200mg/回(4錠)
1.36以上1.66未満	1500mg/回(5錠)
1.66以上1.96未満	1800mg/回(6錠)
1.96以上	2100mg/回(7錠)