

対象疾患	レジメン名称	投与サイクル	投与間隔
大腸がん	PER+HER	PDまで	3週間

【投与スケジュール】

【初回】PER 840mg/body d1 + HER 8mg/kg d1 q3w

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1
末梢メイン)A	生理食塩液 (100ml)	1 V	3時間30分		○
末梢側管)①	<b>パージェタ</b>	<b>840 mg/body</b>	1時間		○
	生理食塩液 (250ml)	1 V			
末梢側管)②	生理食塩液 (50ml)	1 V	1時間	観察時間	○
末梢側管)③	<b>トラスツズマブ(初回)</b>	<b>8 mg/kg</b>	1時間30分		○
	生理食塩液 (250ml)	1 V			

点滴順序:初回 メイン)A → 側管)① → 側管)② → 側管)③

【2回目以降】PER 420mg/body d1 + HER 6mg/kg d1 q3w

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1
末梢メイン)A	生理食塩液 (100ml)	1 V	1時間		○
末梢側管)①	<b>パージェタ</b>	<b>420 mg/body</b>	30分		○
	生理食塩液 (250ml)	1 V			
末梢側管)②	<b>トラスツズマブ</b>	<b>6 mg/kg</b>	30分		○
	生理食塩液 (250ml)	1 V			

点滴順序:2回目以降 メイン)A → 側管)① → 側管)②

【備考】