

対象疾患	レジメン名称	投与サイクル	投与間隔
膵がん	GEM+S-1(切除可能・術前)	2サイクル	3週間

【投与スケジュール】

GEM 1000mg/m<sup>2</sup> d1,d8 + S1 80mg/m<sup>2</sup> d1夕~d15朝 q3w

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1	d8
末梢メインA	生理食塩液(250ml)	1 V	ラインキープ用		○	○
末梢側管①	グラニセロンバッグ	1 P	15分		○	○
	デカドロン(6.6mg)	1 V				
末梢側管②	<b>ゲムシタピン</b>	<b>1000 mg/m<sup>2</sup></b>	30分		○	○
	生理食塩液(100ml)	1 V				

点滴順序:メインA → 側管① → 側管②

【備考】

内服: S1 投与量は以下を参照とする。1日2回 朝夕食後 Day1夕~Day15朝まで内服

**S-1 投与量**

体表面積(m <sup>2</sup> )	投与量
1.25未満	80mg/day
1.25~1.5未満	100mg/day
1.5以上	120mg/day

**腎機能による減量基準**

CCr(ml/min)	投与開始量
60~80	初回基準量(必要に応じて1段階減量)
40~59	1段階減量
30~39	2段階減量