

対象疾患	レジメン名称	投与サイクル	投与間隔
大腸がん	【隔週投与】mFOLFOX6+Cetuximab	PDまで	2週間

【投与スケジュール】

Cetuximab 500mg/m<sup>2</sup> d1+L-OHP 85mg/m<sup>2</sup> d1+LV 200mg/m<sup>2</sup> d1+5-FU bolus:400mg/m<sup>2</sup> d1+5-FU infuser:2400mg/m<sup>2</sup> d1-3 q2w

	薬剤名	数量	点滴時間	備考	d1
CVメインA	生理食塩液(250ml)	1 V	ラインキープ用		○
CV側管①	生理食塩液(50ml)	1 V	15分		○
	デカドロン(6.6mg)	1.5 V			
CV側管②	アービタックス	500 mg/m <sup>2</sup>	2時間(初回)	1時間30分(2回目) 1時間(3回目以降)	○
	生理食塩液(250ml)	0.6 V			
CVメインB	グラニセロンバッグ	1 P	30分		○
CVメインC	レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	2時間		○
	5%ブドウ糖液(250ml)	1 V			
CV側管③	オキサリプラチン	85 mg/m <sup>2</sup>	2時間		○
	5%ブドウ糖液(250ml)	1 V			
CVメインD	5-FU	400 mg/m <sup>2</sup>	全開	全開投与	○
	5%ブドウ糖液(50ml)	1 V			
CVメインE	5-FU	2400 mg/m <sup>2</sup>	46時間		○
	生理食塩液(20ml)	1 V			

点滴順序:メインA → 側管① → 側管② → メインB → ((メインC+側管③) → メインD → メインE

【備考】

内服:レスタミン(10mg) 1回5錠 アービタックス投与30分前に内服